Расслоения

Hoffmann-Singleton

J. Seidel

$\mathbb{P}^3(\mathbb{F}_2) = \mathbb{F}^4 \setminus \{0\}$

$\{(x_1 : x_2 : x_3 : x_4)\}$ $\quad \#(P) = 15$

$\#(\mathcal{L}) = 35$

$V = P \cup \mathcal{L}$ — множество времени в $\mathbb{P}^3$

1. $p_1, p_2 \in P$ не смежные
2. $(p, \ell) \in E \iff p \in \ell$
3. $(\ell_1, \ell_2) \in E \iff t_1 \cap t_2 = \varnothing$

$\#(M) = 7$ в нём все тройки $\#(T) = 35$

$\mathcal{L} \xleftrightarrow[\text{биекция}]{} MT \iff [\ell_1 \cap \ell_2 \neq \varnothing \iff t_1 \cap t_2 = \{*\}]$

1) $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$

2) Вложение K_7 в T^2 (тор)



⇓ Разноцветный периодический граф из 7 цветов

42 гекс паркетник

диагр. $\mathbb{Z}^2$-периодическая раскр. плоскости в 7 цветов Воронова

3) Помидор Кеара

$B = 7$

$P = 21$

$\Gamma = 14$

Выбираем из них 14 треуг.

Этот многогр. тополог. тор.

14 прям из 7 точек

$C_7^3 = 35$ - число треуг.



6	1 2 3
1	1 3 4
2	1 4 5
3	1 5 6
4	1 6 7
5	1 7 2

$G_2 =$ 

$G_1 =$

Прямое произв. графов

$G_1 = (V_1, E_1)$

$G_2 = (V_2, E_2)$

$G_1 \times G_2 = \big(V_1 \times V_2, (u_1, u_2) \sim (v_1, v_2)\big)$

$\iff u_1 = v_1, u_2 \overset{\text{смежно}}{\sim} v_2$

или $u_1 \sim v_1, u_2 = v_2$ }

Валентность $= \dim G$

Расс. E с базой B и слоем F

E получ. из B так: $\forall v \in V(B)$ заменяем на экземпляр графа F. Если (v_1, v_2) - ребро B, то в E подграфы F_1 и F_2 соединены рёбрами по некот. вз. однозн. соотв.

Пример (1) $P_{10} \downarrow C_5$ K_2



(2) $HS_{50} \downarrow C_5$ $K_{5,5}$

Прообраз $p^{-1}(\multimap) \cong P_{10}$

B, F, C связность

$B, P, p^{-1}(\multimap) \cong C$

Расслоения и графы малого диаметра.

E - расс. Петерсена $\downarrow$ $F = C_5$, связн. - P_{10} $\quad diam(E) \leq d+1$

B - граф диам. d



k - вал.

n - число верш.

d - диаметр

Проблема графов мал. диаметра

Для данных k и d найти граф с max n.

$d = 2 \quad n = 32$

$k = 6$



F_4 - слой

C_5 - база

Предл. $Sp(G_1 \times G_2) = Sp(G_1) + Sp(G_2)$



K_2 — $\{-1, 1\}$ $\quad K_2 \times K_2$ — $\{-2, 0^2, 2\}$

$K_2 \times K_2 \times K_2$ $\{-3, -1^3, 1^3, 3\}$

Теорема E - расс. Петерсена $\downarrow C_5$ B

$Sp(E) = (Sp(B) + 2) \cup \cup \{\lambda, -1-\lambda\}$

Спектры гр. Мура:

k	
3	$(-2^4, 1^5, 3)$
7	$(-3^{21}, 2^{28}, 7)$
57	$(-8^{1520}, 7^{1729}, 57)$

$K_{5,5}$ $\{-5, 0^8, 5\}$