S^1

S^2 T^2 крендель ...

T^3 S^3 -?

Инварианты Васильева

Алгебра Хопфа хордовых диаграмм

1990 В. Васильев
1992 М. Концевич

Узел $f: S^1_{\text{ор.}} \to \mathbb{R}^3_{\text{ор.}}$ C^∞ $f' \neq 0$

$f_1 \sim f_2 \Leftrightarrow$ $S^1 \xrightarrow{f_1} \mathbb{R}^3$, h_1, h_2 сохр. ор.

$S^1 \xrightarrow{f_2} \mathbb{R}^3$

$\{f_t\}: [0,1] \times S^1 \to \mathbb{R}^3$

$\{h_t\}: [0,1] \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

3_1



трилистник – не экв. зерк. отраж. → не экв. узлу с противоположн. ориент.

1962 Троттер

$f(S^1) = \Gamma \xrightarrow{p} \mathbb{R}^2 \subset \mathbb{R}^3$

$dp = 0$

Вчинчер 1892: $\exists$ проекция узла с одной особой точкой вида ✳



Упр. Вложить узел 3_1 в объед. 3 плоскостей (книгу из 6 листов)

K_0 – множ. всех узлов с точн. до экв.

Инв. узлов $\varphi: K_0 \to \mathbb{C}$

K_n – мн. особых узлов имеющих $\neq n$ дв. точек

$S^1 \to \mathbb{R}^3$  $\in K_2$ $\quad K = \bigcup_{h \geq 0} K_n$

φ продолжается до $\varphi: K \to \mathbb{C}$: $\varphi(\times) = \varphi(\nearrow\!\!\nearrow) - \varphi(\nearrow\!\!\searrow)$

$f: S^1 \to \mathbb{R}^3$ $M > \sum$ codim = 1

$\varphi(k) = \sum_{\varepsilon_i} (-1)^{|\varepsilon|} k_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n}$ $k \in K_n$





$\varphi: K \to \mathbb{C}$
инв. Вас. пор. $\leq n$
$\varphi / K_{n+1} \equiv 0$

$V_n \subset V_{n+1}$

$V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset V_3 \subset \dots$ $\quad \bigcup_{n \geq 0} V_n = V$

n	0	1	2	3		12
dim V	1	1	2	3	...	⊛

Все пространства конечномерны.

$V_0 = \{\varphi: K \to \mathbb{C} : \varphi|_{K_1} \equiv 0\}$



В процессе деформации значение инв. не менялось $\Rightarrow v(k) = c$

$V_1 = \{\varphi: K \to \mathbb{C} : \varphi|_{K_2} \equiv 0\}$

Лемма $v\left(\boxed{A} \boxed{B}\right) = 0 \quad \forall v \in V$

$v\left(\quad - \quad\right) = 0$ (совмещаются поворотом на 180°)

$V_1 = V_0$ $\quad \varphi \in V_1 \overset{?}{\Rightarrow} \varphi \in V_0$, $\varphi|_{K_2} = 0 \overset{?}{\Rightarrow} \varphi|_{K_1} = 0$

$\xrightarrow{\times\,\times}$ $\varphi = 0$ по лемме.



1122



1212

Опр. Х. д. n пар точек (с точн. до дифф S^1, сохр. ориент.)

$(a_1 a_2 \dots a_{2n})$ в алф. из n букв $b_1, \dots, b_n$ с точностью до цикл. перест. ($\mathbb{Z}_n$) и перест. (S_n).

Хордовая диаграмма особого узла



$\to \mathbb{R}^3$ прообразы дв. точек