Изоморфизм $B \cong \mathcal{F}$.

(T) Отображение $\chi : B \to \mathcal{F}$

$$\chi(b) = \frac{1}{k!} \sum_{S_k} \chi_\pi(\hat{b})$$

$\hat{b}$ – граф b с пронумер. одноцвет. верш.

цвет. изом. град. мин. пространств сохр. коумн. и не сохр. умн.

Следствие 1. $\forall n \quad P_n(\mathcal{F}) \cong P_n(B)$

$$\mathcal{F} = S(P(\mathcal{F})) \cong S(P(B)) = B$$

Следствие 2. $P(\mathcal{F})$ порожд. связными д. Ф.

AS, IHX сохр. связность

$$B_n = B_n^{св.} \oplus B_n^{несв.}$$
$$\| \qquad \|$$
$$P_n \qquad R_n$$

$$\mathcal{F}_n \cong \mathcal{F}_n^{св} \oplus \mathcal{F}_n^{несв.}$$

$$B = \bigoplus B_n^{(k)} \quad k\text{-число 1-вал}$$

$\mathcal{F}^{(k)}$ = порожд. д. Ф. с $\le k$ внешних вершин.

Пример



B_0 1

B_1

B_2

B_3

$\chi(1) = 1$

$\chi(\text{—}) =$

$\chi(\text{—o—}) =$

$\chi(\text{=}) = \frac{2}{3}$ + $\frac{1}{3}$

$\chi(\text{—o—o—}) =$

$\chi(\text{—o—o—}) = * \frac{1}{6}$

$\chi(\text{≡}) = * \frac{1}{3}$ + $\frac{1}{12}$

Матрица отобр. – треуг. с единицами на диагонали.

Построение обратного отображения.

$D_F^{(k)}$ – д. Ф. с $\le k$ внешних вершин.

I_k – мин. идеал. всех STU, IHX, AS соотн. для элем. $D_F^{(k)}$ (входят только д. Ф с $\le k$ вн. в.)

$$\mathcal{F}^{(k)} = \langle D_F^{(k)} \rangle / I_k, \quad \mathcal{F}^{(k)} \subset \mathcal{F}^{(k+1)} \subset \dots$$

$\tau_k : \langle D_F^{(k)} \rangle \to B$

инд. 1) $\tau_k / I_k = 0$

2) $\tau_k / \langle D_F^{(k-1)} \rangle = \tau_{k-1}$

$\{\tau_k\}_{k=0} \Rightarrow \tau : \mathcal{F} \to B$

$k=1$ ∀ такая д. $\Phi = 0$ в $\mathcal{F}$

[B или B =0]

τ_{k-1} есть. Постр. τ_k.

(*) $\tau_k(f) = \tilde{f} + \frac{1}{k!} \sum_{\pi \in S_k} \Lambda_f(\pi)$, где $\Lambda_f(\pi) = \tau_{k-1}(f - \pi f)$

$\tilde{f}$ – эл-т B, получ. отбр. петли.

Вопрос Определим действие S_k на $\langle D_F^{(k)} \rangle$ при помощи нумерации вн. в. эл-та $f \in \langle D_{F_2}^{(k)} \rangle$. Будет ли (*) зависеть от выбора нумерации?

$\mathcal{F} \approx \underset{\text{мин. д. Ф}}{\mathcal{L}}$ STU

1↔1 Проход. через ∞ для эл-та $\mathcal{L}$ даёт эл-т равный данному по STU (анал. корр. умн.)

1↔2 $\mathcal{F} \approx \mathcal{L}$

Действие S_k на мин. диагр.

(21)(345)

φ-ла для Λ.

$\pi = T_{i_1} T_{i_2} \dots T_{i_s} \qquad T_i = (i, i+1)$

S_k порождена $\{T_1, \dots, T_{k-1}\}$

$$f - \pi f = f - T_{i_s} f + (T_{i_s} f) - T_{i_{s-1}}(T_{i_s} f) + \dots + T_{i_2} \dots T_{i_s} f -$$
$$- T_{i_1} \dots T_{i_s} f = \sum_{j=1}^{s} Y_{i_j} T_{i_{j+1}} \cdot \dots \cdot T_{i_s}(f) \quad (**) \qquad \text{⊗} = 2 \text{Y}$$

Y_i τ (Y) = $\Lambda_f(\pi) = \frac{1}{2}$ —o—